



cabildofuer.es

Aguililla canaria, Busardo ratonero

Buteo buteo insularum

Subespecie endémica de Canarias.

Descripción

Rapaz (que tiene el pico robusto y encorvado, las alas fuertes y las patas provistas de unas garras muy afiladas que les sirven para cazar a sus presas), robusta de tamaño medio, longitud: 51-57 cm, envergadura: 113-128 cm. Plumaje de coloración pardo-oscuro, destacando una banda más pálida con listas pardas a la altura del pecho, aunque varía de individuos, de bastante claros a otros más oscuros. En vuelo destaca el contraste entre las primarias y secundarias muy pálidas y los extremos oscuros. La **subespecie insularum** se diferencia por su tamaño ligeramente menor, variabilidad del plumaje menos pronunciada, partes superiores algo más parda y partes inferiores más rayadas.

Dieta

Se alimenta de conejos y ardillas morunas, la carroña (animales muertos) es también una fuente de alimento, en especial para individuos jóvenes. También captura ratas, aves, lagartos e invertebrados.

Hábitat

Los territorios de cría se ubican mayoritariamente en cuchillos, barrancos, acantilados costeros y en zonas montañosas. Las áreas de alimentación son zonas abiertas, como valles, zonas de cultivo, llanos. También se observan en comederos y vertederos. Ocupa prácticamente todos los hábitats disponibles desde la costa hasta los 2000 m.

Distribución en Fuerteventura

Prácticamente en toda la isla, de norte a sur y desde el nivel del mar hasta las cumbres más altas. Las mayores densidades se encuentran en los valles de Fimapaire, Vallebrón y Guisgüey, en el norte, Macizo de Betancuria y Cuchillos de Vigán en el centro, y en el macizo de Jandía, en el sur. También está bien representada en los barrancos. No se encuentra en Lobos.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Régimen de protección especial".