




Hembra



Macho

cabildofuer.es

Cernícalo, cernícalo vulgar

Falco tinnunculus dacotiae

Descripción

Rapaz diurno, longitud: 32-35 cm, envergadura: 71-80 cm. Presenta un acusado dimorfismo sexual (diferencias entre machos y hembras). El macho es más rojizo en la parte superior, con motas más pequeñas y partes inferiores más suaves y menos marcadas, y la cabeza y la cola de color gris azulado. La hembra tiene las partes superiores mucho menos barradas (manchas irregulares) y las partes inferiores más rosadas y menos marcadas que la subespecie canariensis, la cabeza y la parte superior de la cola son de color marrón claro. Los individuos de la subespecie *dacotidae* se distinguen de la raza típica por su menor tamaño, con las partes superiores más pálidas y las partes inferiores algo más rojizas.

Dieta

Insectos, como escarabajos y saltamontes, vertebrados, como lagartos y ratones. Ocasionalmente pueden capturar conejos y ardillas morunas, también depreda sobre pequeñas aves y pollos en nidos.

Hábitat

Acantilados costeros, zonas montañosas, conos volcánicos y barrancos. Puede criar en muros de presas y casas antiguas.

Distribución en Fuerteventura

Distribuido por toda la isla, en localidades de interior con zonas de cultivo como: La Oliva, Vallebrón, Caldereta, Antigua, Tuineje y Betancuria entre otras. Lobos cuenta con pocas parejas.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Régimen de protección especial".