



Hembra



Macho

cabildofuer.es

Tarabilla canaria, caldereta

Saxicola dacotiae dacotiae

Endemismo de Fuerteventura. Una de las especies de aves endémicas del archipiélago canario, que nidifica exclusivamente en Fuerteventura.

Descripción

Paseriforme (aves cantoras), pequeña, longitud: 11-12,5 cm y 15 cm de envergadura. Los machos adultos, presentan un color pardusco por el dorso y pecho blancuzco, con parche de extensión variable entre individuos, de color naranja debajo de la garganta. La cabeza es negra como en la tarabilla común, pero difiere de ésta por tener la garganta blanca, y también por mostrar una ceja superciliar blanca (muy variable en extensión). Las hembras adultas, tienen el dorso y cabeza pardusca y, al igual que los machos, presentan la ceja superciliar blanca y coloración naranja en el pecho, pero ambas características son significativamente más apagadas.

Dieta

Principalmente, hormigas, moscas, larvas y gusanos, también pueden consumir arañas, pequeños reptiles y frutos de los espinos.

Hábitat

Zonas rocosas con un cierto desarrollo de arbustos y matorrales, habitualmente en barrancos, laderas, e incluso en cultivos y malpaíses. El nido se ubica bajo rocas o plantas e incluso ocasionalmente en el propio matorral.

Distribución en Fuerteventura

Prácticamente en toda la isla, de norte a sur y desde el nivel del mar hasta las cumbres más altas. Las mayores densidades se encuentran en los valles de Fimapaire, Vallebrón y Guisgüey, en el norte, Macizo de Betancuria y Cuchillos de Vigán en el centro, y en el macizo de Jandía, en el sur. También está bien representada en los barrancos. No se encuentra en Lobos.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Vulnerable".

Catálogo Canario de Especies Protegidas: "Vulnerable".