

cabildofuer.es

Paíño de Madeira

Hydrobates castro

Descripción

Ave marina, pelágica (que tienen hábitos oceánicos). Longitud: 19-21 cm y envergadura: 44-46 cm. De coloración general oscura y obispillo (parte de la anatomía de las aves inmediatamente superior a la cola) blanco. Se distingue del paíño europeo por carecer de la barra blanca en la parte inferior de las alas y por su cola ligeramente ahorquillada.

Dieta

Se alimenta principalmente de peces de pequeño y mediano tamaño, también de cefalópodos (pulpo, calamar, sepia).

Hábitat

En época de cría se observan en aguas más cercanas a la costa, cuando finaliza este periodo permanecen en alta mar. Cría en agujeros, en la tierra o en la roca, en islotes, acantilados costeros y barrancos.

Distribución en Fuerteventura

Estos son algunos de los lugares donde se distribuyen: las mayores colonias de cría se encuentran en Lobos y en los acantilados de la costa entre Esquinzo y Ajuy y entre Pozo Negro y Gran Tarajal. De forma dispersa también se han observado al sur de Corralejo, Caleta de Fuste y en la costa entre Giniginámar y La Lajita. En Jandía se encuentran entre el roque del Moro y Punta Pesebre.

Estatus de protección

Catálogo Español de Especies Amenazadas: "Vulnerable"

Catálogo Canario de Especies Protegidas: "Vulnerable"